

Doporučení úpravy technologie Conviso SMART při zvýšeném výskytu rozrazilu

Technologie Conviso SMART je velmi účinná a řeší prakticky většinu plevelů. Jednou z mála výjimek je rozrazil, kde je účinnost herbicidu Conviso ONE jen kolem 50 %. Při slabém výskytu rozrazilu není třeba tento nedostatek zvlášť řešit. Řepa je dostatečně konkurenceschopná a po zaklopení řádků rozrazil sám vymizí, takže nedochází k jeho dalšímu množení. Při silném, raném výskytu ovšem hrozí, že bude konkurovat malým rostlinkám řepy v odběru živin a vláhy – tady je třeba zasáhnout!



Ošetření je třeba cílit podle fáze rozrazilu a použít přípravky obsahující účinnou látku phenmedipham (např. Fenifan, Betanal Tandem). Potom lze pokračovat v ošetření Convisem ONE na ostatní plevele v termínech podle fáze merlíku, tak jak je doporučeno při použití technologie Conviso SMART.

Důležitá je fáze rozrazilu – likvidace se spíše doporučuje ve fázi děložních listů. Jakmile se začnou objevovat pravé listy, citlivost rozrazilu na herbicid se snižuje. Při ošetření v děložních listech je plevel zpravidla citlivý dostatečně a při rovnoměrném vzcházení stačí jedno ošetření.

APLIKAČNÍ TABULKA:

Termín T1 klasik – rozrazil v děložních listech	Termín T1 SMART – merlík ve fázi dvou pravých listů	Termín T2 – nejméně 10 dní po T1 SMART
	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha
Betanal Tandem 1,0 l/ha	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha
Betanal Tandem 1,0 l/ha	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha Betanal Tandem 1,0 l/ha	Conviso ONE 0,5 l/ha Mero 1,0 l/ha

Obrázek 1: Rozrazil ve fázi prvního páru pravých listů – už pozdě na ošetření klasickým herbicidem



Obrázek 2: Merlík ve fázi prvního páru pravých listů – vhodná aplikace T1 **Conviso One**



Obrázek 3: Merlík ve fázi 2.páru pravých listů a rozrazil ve fázi prvního páru pravých listů – k aplikaci Conviso ONE je možno přidat phenmedipham.

