


## Cerkospori3za 2022, 1. zpr3va ke 12.7.2022

Pokraujeme v projektu Monitorov3n3 cerkospori3zy, oproti lořsku jsme rozř3řili poet lokalit (zvl3řt3 na Litom3řicku):

Pozorov3n3 citliv3ch odrůd v porostech	19 lokalit, kad3 pond3l3
Pozorov3n3 na citliv3 krmn3 řep3	6 lokalit, kad3 pond3l3
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denn3 hl3šen3
Sledov3n3 letu sp3r cerkospor3	6 lokalit, pŕub3žn3, anal3za 2 x t3dn3

Na z3klad3 pozorov3n3 citliv3ch odrůd byla k 12.07.2022 sestavena mapka



Prvn3 pŕ3znaky jsme zaznamenali zvl3řt3 v okol3 Prahy, na Boleslavsku a Kol3nsku. V souasn3 chvil3 nejsou ŕpln3 ide3ln3 podm3nky k rozvoji choroby vzhledem k niřř3m non3m teplot3m, ale t3m3ř vřude ŕř dořlo k prim3rn3 infekci. Je tŕeba zat3 pl3novat fungicidn3 ochranu.




Ze sledov3n3 pov3trnostn3ch podm3nek pro rozvoj infekce je zŕejmn3, že ide3ln3 podm3nky pro rozvoj byly jiř na konci ervna

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

	Černuc (Velvary)	Bezno (Mladá Boleslav)	Dobrá Voda (Hořice)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Králové)	Bylany (Chrudim)
25.6.						
26.6.						
27.6.						
28.6.						
29.6.						
30.6.						
1.7.						
2.7.						
3.7.						
4.7.						
5.7.						
6.7.						
7.7.						
8.7.						
9.7.						
10.7.						
11.7.						

V týdnu od 4. do 10.7. jsme zahájili sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí nasávacích lapačů. Lapače jsme instalovali v pondělí 4.7.2022 a analýzu pak dělali za první a druhou polovinu týdne. První výsledky jsou uvedené v grafu. Velké množství spór ve vzduchu v Městci Králové souhlasí s větším výskytem skvrn cerco v porostu.



**Doporučení: Riziko výskytu cercosporiózy se výrazně zvýšilo. Je třeba důsledně zkontrolovat porosty a v případě prvních příznaků začít s fungicidním ošetřením. Zvláště se zaměřit na rizikové lokality – vyšší vlhkost pozemků, infekce v půdě (řepa po řepě, místa skládek řepy), citlivé odrůdy. Také máme hlášení, že dochází k další vlně náletu makadlovky řepné a lokálně se objevují housenky můry gama. V případě potřeby fungicidní postřik doplňte insekticidním přípravkem!**