


## Cerkospori3za 2022, 4. zpr3va k 2.8.2022

Pokraujeme v projektu Monitorov3n3 cerkospori3zy, oproti losk3mu roku sledujeme d3iv3j n3stup infekce zhruba o t3yden:

Pozorov3n3 citliv3ch odr3d v porostech	19 lokalit, kad3e pond3el3
Pozorov3n3 na citliv3 krmn3 3ep3	6 lokalit, kad3e pond3el3
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denn3 hl3šen3
Sledov3n3 letu sp3r cerkospor3y	6 lokalit, p3rb3en3, anal3za 2 x t3ydn3

Na z3klad3e pozorov3n3 citliv3ch odr3d byla k 2.8.2022 sestavena mapka




O v3kendu jsme se na v3tin3 lokalit dokali det3 (v3tinou od 10 do 40 mm). Na mnoha pozemc3ch ub3hly zhruba t3i t3ydn3 od prv3n3ho fungicidn3ho oet3en3 a 3innost p33pravk3 pomalu kon3. U strobilurin3 se uv3d3 d3lka 3innosti zhruba 3 t3ydn3, u azolov3ch p33pravk3 m3e b3t 3innosti i krat3. I p3estoe nad3le trv3 trend pom3rn3 such3ho poas3, tak se cerkospori3za roz33ruje. Krom3 cerkospori3zy se objevuj3 i dal3 listov3 choroby nap3. ramul3rie. Stav chr3stu se d3ky such3mu poas3 m3rn3 zhoruje. N3r3st v3skytu listov3ch chorob oproti minul3mu t3ydn3 jsme zaznamenali prakticky na vech sledov3n3ch lokal3t3ch. V33 tlak cerkospori3zy pozorujeme hlavn3 v okol3 Prahy, na Kol3nsku ale i Hradecku.




Foto: Cukrovka napaden3 ramul3ri3, 2.8.2022

Denní infekční koeficienty neindikují zcela ideální podmínky pro rozvoj a šíření cercosporiózy, ale přeci jen se zvyšují. Vzhledem k tomu, že prvotní infekce už je v porostech přítomná je riziko prudkého zhoršení stavu velmi vysoké.



V týdnu od 25. do 31.7. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí nasávacích lapačů. Analýzu jsme znovu dělali za první a druhou polovinu týdne. Pohyb spór vzduchem se opět nepotvrdil ani v jednom z termínů. Cercosporióza je ovšem již uvnitř listů a může se v příznivých podmínkách rozšiřovat.



**Doporučení:** Vzhledem k délce účinnosti fungicidních přípravků, vývoji počasí a stavu porostů doporučujeme začít s druhou fungicidní aplikací. V případě, že porost cukrovky je více napadený cercosporiózou doplnit aplikaci opět o přípravky obsahující měď. Do druhé aplikace volit přípravek s jinou účinnou látkou, než byla v první aplikaci. Aplikaci naplánovat vzhledem k vysokým denním teplotám do brzkých ranních nebo pozdních večerních termínů.