

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2025, 1. zpráva k 24.6.2025

Dobrý den, znovu zahajujeme projekt Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Začínáme už poslední týden v červnu, protože se letos selo brzo, vegetace je pokročilejší a infekce by se mohla objevit dříve. Opět budeme vycházet z více infomačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercospóry	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

V této první zprávě máme pouze jeden pozitivní signál – viz foto.

Jako obvykle, i letos už byla cercosporióza v porostech identifikována, máme zprávu o dvou případech z Moravy a i my jsme objevili 1 skvrnu ve Vyšehořovicích, kde jsme se po kultivaci v laboratoři ujistili, že skutečně o cercosporiózu jde. V tomto termínu se daleko častěji u podobných skvrn jedná o bakteriózy, které někdy pěstitelé vyprovokují k předčasnému fungicidnímu zásahu. Ani ten náš pozitivní nález nepřeceňujeme, je to spíš signál, že by letos mohla silnější infekce nastoupit dříve, než jsme zvyklí, na nejexponovanějších lokalitách v první dekádě července. Aktuálně riziko snižuje předpověď počasí: trvá horko a sucho, déšť bude pravděpodobně jen z lokálních bouřek a konidie na okrajích pozitivních skvrn velmi pravděpodobně zaschnou. Ošetření zatím není aktuální. S blížící se sklizní obilovin je ovšem třeba zvážit svou flexibilitu. Ten, kdo musí volit preventivní ochranu, mohl by v příštích dvou týdnech použít strobiluriny (Amistar Gold) s preventivním účinkem.



A

B

C

A/ nepravidelná skvrna – pravděpodobně není cercosporióza

B/ koncentrická hnědá skvrna – pravděpodobně není cercosporióza (foto: J.Migdau)

C/ pravidelná skvrna s tmavým okrajem – je cercosporióza (náš nález z Vyšehořovic 23.6.2025, foto Pavlů)

DOPORUČENÍ:

První příznaky cerkosporiózy se zatím objevují opravdu jen zcela ojediněle. Rozhodně není ošetření akutní. Kontrolujte porosty se zvýšeným rizikem infekce: vlhčí lokality, řepa po řepě, silná infekce v minulosti, citlivá odrůda. V případě, že tam typické skvrny najdete a víte, že pro Vás bude obtížné se do porostů v příštích 14 dnech operativně dostat, je možné zvolit preventivní aplikaci. Doporučujeme strobiluriny nebo jen levnou mēď. Sledujte dál náš monitoring!

V porostech se začaly objevovat ve zvýšené míře vyběhlce!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepařský institut Semčice