

## MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2025, 10. zpráva ke 25.8.2025

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Vycházíme z těchto informačních zdrojů:

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Pozorování citlivých odrůd v porostech | 20 lokalit, každé pondělí              |
| Teplota a vlhkost v porostech          | 6 lokalit, denní hlášení               |
| Sledování letu spor cercosporý         | 6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně |

Naše zprávy letos jsou velmi jednoduché, v průběhu srpna pořád stejné: Pokračuje letní počasí, slunce, nízká vlhkost vzduchu, nejsou to podmínky pro výraznou expanzi cercosporiózy, nebezpečí, že dojde ke zhoršení je už malé. Cercosporové skvrny jsou na všech porostech, ale nemnoží se, porosty jsou dosavadní fungicidní ochranou a průběhem počasí dobře chráněné. Mohou se vyskytovat výjimky, to je však opravdu individuální záležitost, my ji v našem pozorování neregistrujeme. Doporučujeme zkontrolovat porosty, jestli se někde situace nezhoršuje, pokud ano, pak provést ještě poslední fungicidní ošetření. Jinak se domníváme, že další riziko je minimální a ochranu je možno ukončit. Letošní problém není cercosporióza, nýbrž malý a v suchém počasí stále se zmenšující chrást. S tím se ovšem nedá dnes nic dělat, ovlivní to přírůstek výnosu během podzimu, ty asi nebudou letos velké.




Na obrázku je silně napadený porost ve Vyšehořovicích (Čelákovice). Rozsah napadení se už 2 týdny nemění, nekrózy se nezvětšují, problém je malý chrást, malá zelená, fotosyntetizující plocha.

Výsledky našeho monitoringu:

1. Měření podmínek pro rozvoj choroby – teploty a vlhkosti v porostech – ukazuje trvalý nepříznivé podmínky pro cercosporiózu. Sucho a chladné noci cercosporiózu nepodporují. V letošním ročníku tak bylo pouze jedno rizikové období, poslední týden v červenci s koincidencí vysoké teploty a vlhkosti.

2. Mapa aktuálního výskytu ukazuje přítomnost infekce prakticky na všech porostech, jen v několika případech se však jedná o větší slité nekrózy (Dřevčice, Černuc, Vyšehořovice), většinou jsou to pořád jen jednotlivé skvrny a infekce se nezhoršuje:



3. Sledování letu spór vzduchem: V průběhu celého srpna byl záchyt spór houby minimální, v posledním týdnu zcela nulový.

Shrnutí monitoringu: Pokračuje situace se slabším, dobře zvládnutelným tlakem choroby.

## DOPORUČENÍ:

**Cerkosporióza se nešíří, rozsah napadení zůstává už třetí týden stejný. Zkontrolujte porosty, jestli se někde neobjeví výjimka z této situace, jinak je možno fungicidní ochranu v tomto ročníku ukončit. V těch výjimečných případech, kde třeba přišly lokální srážky a infekce postoupila, doporučujeme ještě ošetření a může dostačovat samotná měď.**

Klára Pavlů, Jaromír Chochola, Řepařský institut