

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2025, 2. zpráva k 1.7.2025

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Letos se selo brzo, vegetace je pokročilejší a infekce by se mohla objevit dříve. Opět budeme vycházet z více infomačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně


Velmi pozvolna se začínají objevovat první tečky na listech. Předpověď počasí zatím slibuje pokračující trend extrémně vysokých teplot prakticky beze srážek. Suché počasí šíření infekce nepodporuje – konidie na skvrnách zasychají a nedochází k dalšímu šíření houby v porostech. Denní infekční koeficienty (DIK) jsou stále velmi nízké a nesignalizují zvýšené riziko šíření cercosporiózy. S nastupujícím obdobím žní se ovšem řadě z Vás zkomplikuje možnost operativního zásahu. Ten, kdo musí volit preventivní ochranu, mohl by v příštích dvou týdnech použít strobiluriny (Amistar Gold) s preventivním účinkem. V případě lokálních srážek a zvýšení vlhkosti v porostech je třeba řepu zkontrolovat.

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
23.6.						
24.6.						
25.6.						
26.6.						
27.6.						
28.6.						
29.6.						
30.6.						
1.7.						

Poznámka: Objevuje se další vlna makadlovek. V našich lapačích jsme ji zachytili ve Vyšehořovicích a Bylanech, mírně i v Dobrovinci. Bohužel zásah insekticidem v tomto období bude mít velmi nízkou účinnost. Pyretroidy v teplém počasí neúčinkují a aplikaci je třeba provést nejlépe v noci.

Na mapce jsou výsledky monitoringu. Na lokalitách se zjištěným výskytem cercosporiózy se zatím jedná jen o ojedinělé tečky na středně starých listech. Hodnocení probíhá na 100 rostlinách.



Na našich pokusných lokalitách jsme umístili opět lapače spór a příští týden budeme mít první výsledky, které přinesou informaci o množství patogenu ve vzduchu.



DOPORUČENÍ:

Nadále platí, že ošetření fungicidem zatím není akutní. Kontrolujte porosty se zvýšeným rizikem infekce: vlhčí lokality, řepa po řepě, silná infekce v minulosti, citlivá odrůda. V případě, že tam typické skvrny najdete a víte, že pro Vás bude obtížné se do porostů v příštích 14 dnech operativně dostat, je možné zvolit preventivní aplikaci. Doporučujeme strobiluriny s preventivním účinkem a delší dobou ochrany. Sledujte dál náš monitoring!

V porostech se začaly objevovat ve zvýšené míře vyběhlíce!