

MONITOROVÁNÍ CEREKSPORIÓZY 2025, 8. zpráva ke 11.8.2025

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Vycházíme z těchto informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně


Po deštivých a chladných 3 týdnech se vrátilo letní počasí, slunce, nízká vlhkost vzduchu. Stejně jako před týdnem to nejsou to podmínky pro výraznou expanzi cercosporiózy, ale choroba už je prakticky všude a je ji nutno systematicky brzdit opakovanými aplikacemi fungicidů. Většinou je aktuální 2. aplikace, tam, kde přišla první preventivní aplikace začátkem července už je aktuální aplikace třetí.

Aktuální výsledky našeho monitoringu:


Hodnocení výskytu cercosporiózy na sledovaných 20 lokalitách ukazuje, že infekce už zasáhla všechny porosty a v několika případech se už skvrny slévají do větších nekrotických ploch – viz obrázek



1. Mapka aktuálního výskytu ukazuje přítomnost infekce prakticky na všech porostech:



2. Měření podmínek pro rozvoj choroby – teploty a vlhkosti v porostech – ukazuje příznivou situaci pro řepu a nepříznivou pro cercosporiózu. Ani předchozí, vlhká a chladná, ani aktuální teplá a suchá perioda cercosporiózu neurychlují. To ovšem neznamena, že fungicidní ochrana není potřeba. Průměrná hmotnost chrástu je podprůměrná, musíme se snažit udržet menší listovou plochu zdravou a v letošních podmínkách by se to mělo dařit.
3. Sledování letu spór vzduchem: Nějaké spóry jsme zachytili, není to žádná lavina, tlak choroby není silný, druhá aplikace fungicidů by měla chorobu udržet v přijatelných mezích.



Shrnutí monitoringu: Pokračuje situace se slabším, dobře zvládnutelným tlakem choroby.

DOPORUČENÍ:

Tlak cercosporiózy je slabší, choroba je však prakticky ve všech porostech. Opakovanými aplikacemi fungicidů by měla být letos cercosporióza dobře zvládnutelná. Vzorkování porostů ukazuje velmi nadějně předpoklady pro výnos, ale také poměrně malý chrást, který je potřeba udržet zdravý. Nebržděná cercosporióza ještě může výnos opravdu výrazně snížit. Velmi naléhavě doporučujeme odpočítávat odstup od předešlého ošetření a po 15 – 20 dnech ošetření opakovat, delší interval je možno zvolit u odrůd CR+. Příliš dlouhý odstup mezi fungicidními aplikacemi je dnes jednou z největších chyb. Doporučujeme k organickým fungicidům přidávat měďnaté přípravky pro zvýšení účinnosti a potlačení vzniku rezistencí.

Pokud by se situace dramaticky měnila, půjde z cukrovaru varování prostřednictvím SMS.

Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů, Jaromír Chochola, Řepařský institut