

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2025, 9. zpráva ke 18.8.2025

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Vycházíme z těchto informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

Pokračuje letní počasí, slunce, nízká vlhkost vzduchu, nejsou to podmínky pro výraznou expanzi cercosporiózy, nebezpečí, že dojde k výraznému zhoršení je už malé. Choroba je prakticky všude, ale porosty jsou dosavadní fungicidní ochranou většinou dobře chráněné, jen tam, kde ještě nebyl aplikován 2. postřik je ho třeba provést (u porostů, kde přišel preventivní zásah už začátkem července je aktuální třetí aplikace). Letos profitujeme z příznivého počasí a slabšího tlaku choroby, loni jsme doporučovali 3 – 4 aplikace, letos by měly stačit 2 až 3. U CR+ odrůd by měla bohatě stačit 1 aplikace.


Aktuální výsledky našeho monitoringu:




Hodnocení výskytu cercosporiózy na sledovaných 20 lokalitách ukazuje, že infekce už zasáhla všechny porosty a v několika případech se už skvrny slévají do větších nekrotických ploch – viz obrázek

1. Měření podmínek pro rozvoj choroby – teploty a vlhkosti v porostech – ukazuje příznivou situaci pro řepu a nepříznivou pro cercosporiózu. Ani předchozí, vlhká a chladná, ani aktuální teplá a suchá perioda cercosporiózu neurychlují. To ovšem neznamená, že fungicidní ochrana nebyla a není potřeba. Průměrná hmotnost chrástu je podprůměrná, musíme se snažit udržet menší listovou plochu zdravou a v letošních podmínkách by se to mělo dařit.

2. Mapa aktuálního výskytu ukazuje přítomnost infekce prakticky na všech porostech, jen v několika případech se však jedná o větší slité nekrózy (Dřevčice, Černuc, Vyšehořovice), většinou jsou to pořád jen jednotlivé skvrny a infekce se nezhoršuje:



3. Sledování letu spór vzduchem: Nějaké spóry jsme zachytili jen v Černuci, na ostatních lokalitách nic, tlak choroby není silný, druhá aplikace fungicidů by měla chorobu udržet v přijatelných mezích.



Shrnutí monitoringu: Pokračuje situace se slabším, dobře zvládnutelným tlakem choroby.

DOPORUČENÍ:

Tlak cercosporiózy zůstává slabý, choroba je však prakticky ve všech porostech. Opakovanými aplikacemi fungicidů by měla být letos cercosporióza dobře zvládnutelná. Tam, kde to při odpočítávání třítydenního intervalu mezi aplikacemi ještě do 25. – 30.srpna na další aplikaci vychází, doporučujeme ji ještě provést. Vzorkování porostů ukazuje velmi nadějně předpoklady pro výnos, ale také poměrně malý chrást, který je potřeba udržet zdravý. Samozřejmě, mohou se vyskytnout více napadené porosty, které potřebují intenzívnější ochranu, bude to však letos spíš výjimka. Doporučujeme k organickým fungicidům přidávat měďnaté přípravky pro zvýšení účinnosti a potlačení vzniku rezistencí, na málo napadených porostech může dostačovat samotná měď.

Pokud by se situace dramaticky měnila, půjde z cukrovaru varování prostřednictvím SMS.

Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů, Jaromír Chochola, Řepařský institut