

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 1. zpráva k 1.7.2026

Dobrý den, znovu zahajujeme projekt Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Začínáme na přelomu června a července po extrémně vysokých teplotách. Vegetace je po komplikovaném jaru velmi nevyrovnaná a některé řepy mají zpoždění až 3 týdny. Doufejme, že poměrně mladý chrást bude vůči cercosporióze odolnější, nicméně je třeba ochraně opět věnovat maximální pozornost. Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercospóry	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

PRO PŘIPOMENUTÍ:



A

B


C

A/ nepravidelná skvrna – pravděpodobně není cercosporióza

B/ koncentrická hnědá skvrna – pravděpodobně není cercosporióza (foto: J. Migdau)

C/ pravidelná skvrna s tmavým okrajem – je cercosporióza (náš nález z Vyšehořovic 23.6.2025)

Graf: Záchyt v lapačích spór za poslední 2 týdny v červnu





Cerkospori6za uŹ byla v porostech identifikov6na, m6me laboratorn6 potvrzenou p6ítomnost cercospori6zy na Opavsku a Hradecku. Letos jsme za6ali s odchytom sp6r o n6co d6íve – jiŹ od poloviny 6ervna, a i tady byly pozitivn6 z6chyty na v6ech pokusn6ch lokalit6ch (viz graf). V sou6asn6 chv6li řepa p6etrp6la zhruba t6den extr6mn6 vysok6ch teplot – na pol6ch je vid6t zdecimovan6 chr6st, listy po6kozen6 intenzivn6m slune6n6m z6řen6m a vysok6mi teplotami (foto). Tento chr6st je oslaben6 a m6Źe b6t n6chynl6j66 k dal66m chorob6m. Kone6n6 dorazily de6t6, ale s nimi se zvyšuje i riziko v6666 vzdu6n6 vlhkosti a t6m lep66ch podm6nek pro ř6řen6 cercospori6zy v porostech. Nav6c prud66 de6t6 mohly napomoci 66ste6k6m p6dy obsahuj6c6m houbu *Cercospora beticola* dostat se na listy cukrovky. Zcela z6sadn6 te6ď bude dal66 r6z po6as6. Jestli bude d666t jen z lok6ln6ch bouřek tak konidie na okraj6ch pozitivn6ch skvrn velmi pravd6podobn6

zaschnou. P6i d6eletrvaj6c6 v6666 vlhkosti vzduchu a letn6ch teplot6ch ale m6Źe doj6t k rozvoji infekce. O6et6řen6 zat6m není aktu6ln6. S bl6Ź6c6 se sklizn6 obilovin je ov6em t6eba zv6Źit svou flexibilitu. Ten, kdo mus6 volit preventivn6 ochranu, mohl by v p666t6ch dvou t6dnech pouŹ6t strobiluriny (Amistar Gold) s preventivn6m 66inkem.

DOPORU6EN6:

Prvn6 p66znaky cercospori6zy se zat6m objevuj6 opravdu jen zcela v6jime6n6, ale p66ítomnost infekce byla laboratorn6 potvrzena. O6et6řen6 zat6m není akutn6. Kontrolujte porosty se zvy66en6m rizikem infekce: vlh66 lokalita, řepa po řep6, siln6 infekce v minulosti, citliv6 odr6da. V p666pad6, Źe tam typick6 skvrny najdete a v6te, Źe pro V6s bude obt6Źn6 se do porost6 v p666t6ch 14 dnech operativn6 dostat, je moŹn6 zvolit preventivn6 aplikaci. Doporu6ujeme strobiluriny nebo jen levnou m6ď. Sledujte d6l n66 monitoring!

V porostech se za6aly objevovat ve zvy66en6 m6ře vyb6hlice!