

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 2. zpráva k 8.7.2026

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	20 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spor cercosporý	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

Co je pravděpodobně cercosporióza:



nepravidelná skvrna – pravděpodobně není cercosporióza	koncentrická hnědá skvrna– pravděpodobně není cercosporióza (foto: J.Migdau)	pravidelná skvrna s tmavým okrajem –je cercosporióza (Vyšehořovice 20.6.2025, foto Pavlů)
--	--	--

Zatím jsme nikde (20 lokalit) na listech cercosporóvé skvrny nenašli, spóry houby jsou však na listech na všech našich pokusných místech. Infekce tedy „číhá“, čeká na vhodné podmínky. V posledních 3 – 4 dnech ji pravděpodobně zabrzdilo chladnější počasí. O víkendu se má oteplít, bez srážek a tak doufáme, že spóry na listech „zaschnou“, tenhle odhad však moc jistý není. Doporučujeme tedy především kontrolu porostů a rychlou reakci na první skvrny. Příští týden se asi rozeběhnou žně a tak hodně záleží na akceschopnosti jednotlivých pěstitelů. Ten, kdo si věří, že to zvládne by měl zatím s první aplikací fungicidů vyčkávat. Ten, kdo musí volit preventivní ochranu, mohl by v příštím týdnu použít strobiluriny (Amistar Gold) s preventivním účinkem, případně některý měďnatý přípravek.


Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
-----	---------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------------	---------------------

30.6.	1,8	0	2,3	3	3	2,3
1.7.	5	6	6	5	4	3
2.7.	2	0	2	2	2	2
3.7.	0	0	0,1	0	0	0
4.7.	0	0	0	0	0	0
5.7.	0,5	0	0,2	1,3	0,7	0
6.7.	1		1,4	1	2,4	1

Na našich pokusných lokalitách jsme umístili opět lapače spór a už 3. týden na všech lokalitách spóry houby v poměrně velkém množství zachycujeme



Poznámka k letním škůdcům: Letos už několik týdnů zachytáváme ve feromonových pastech velké množství makadlovek. Doporučujeme brzdit jejich množení insekticidy, třeba i přídavky insekticidu k fungicidům. Zaznamenali jsme už také požerky od housenek mūr – viz foto. Kontrolujte porosty a pokud požerky či housenky objevíte, i tady budou insekticidy důležité, do sklizně by se housenky mohly namnožit až k holožiru. Účinnější je večerní aplikace.



DOPORUČENÍ:

Ošetření fungicidem zatím není akutní. Kontrolujte porosty se zvýšeným rizikem infekce: vlhčí lokality, řepa po řepě, silná infekce v minulosti, citlivá odrůda. V případě, že tam typické skvrny najdete nebo že pro Vás bude obtížné se do porostů v příštích týdnech dostat, je možné zvolit preventivní aplikaci. Doporučujeme strobiluriny s preventivním účinkem a delší dobou ochrany, případně měďnaté přípravky. Kontrolujte makadlovky a housenky a brzděte jejich množení insekticidy. Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepařský institut Semčice