

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 3. zpráva k 15.7.2026





Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD.
Opět budeme vycházet z více infomačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercospóry	6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně



Ačkoliv na začátku července panovaly příznivé klimatické podmínky k rozvoji cercosporiózy a již od poloviny června nepřetržitě zachytáváme spóry houby *Cercospora beticola* ve vzduchu, tak k rozvoji infekce zatím nedošlo. Suché a horké počasí není pro rozvoj choroby příznivé, ale na některých lokalitách už hrozí přísušky. Nyní přichází změna počasí. Lokální bouřky, přívalové deště a kroupy mohou porosty poškodit. Vyšší vzdušná vlhkost bude v dalším vývoji zřejmě rozhodující. Nadále je třeba porosty hlídat, zvláště do deštích.

Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy

Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
30.6.						
1.7.						
2.7.						
3.7.						
4.7.						
5.7.						
6.7.						
7.7.						
8.7.						
9.7.						
10.7.						
11.7.						
12.7.						
13.7.						

Na našich pokusných lokalitách nadále pokračujeme se záchytem spór. Již 4. týden jsou záchyty stabilně nejméně 1000 spór za den. Podmínka primární infekce je tedy splněna.



Stále pozorujeme vysoké záchyty makadlovek v lapácích. Při výskytu na polích doporučujeme přidávat insekticid k fungicidnímu ošetření. V tuto chvíli už je chrást poměrně velký a cílený zásah nebude příliš účinný, ale s použitím levnějších pyretroidů můžeme alespoň trochu snížit četnost populace.

Foto: Srdíčko poškozené housenkou makadlovky.

DOPORUČENÍ:

Ošetření fungicidem nadále není zcela akutní. Kontrolujte porosty se zvýšeným rizikem infekce: vlhčí lokality, řepa po řepě, silná infekce v minulosti, citlivá odrůda. V případě, že tam typické skvrny najdete nebo že pro Vás bude obtížné se do porostů v příštích týdnech dostat, je možné zvolit preventivní aplikaci. Sledujte dál náš monitoring!