

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 7. zpráva k 12.08.2026

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD. Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:























Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercospóry	Už ukončeno, spóry houby jsou všudypřítomné

Na našem hodnocení z předešlých zpráv se nic nemění. Dále trvá neobvyklý průběh ročníku z hlediska vývoje infekce cercosporiózou. Je sucho v půdě a nízká je i vlhkost vzduchu. Infekce byla prokázána sice už od poslední dekády června ve všech sledovaných porostech, ale spóry na listech neklíčí, neprorůstají do listů, stále se masově nevytvářejí cercosporiózové typické skvrny. Až v posledních 2 týdnech se začaly ojediněle objevovat, oproti předešlým ročníkům už s více než čtyřtýdenním zpožděním. A pořád je tady extrémní horko a sucho. Na většině lokalit stále nevidíme akutní potřebu fungicidní ochrany. Je ovšem pravda, že mnoho pěstitelů má postříkáno – někdo praktikuje preventivní ochranu, někdo sází na kalendářní termín a na jistotu. Přesto **neošetřené i už ošetřené plochy je potřeba v první polovině srpna fungicidy ošetřit**. Jakmile nastanou podmínky příznivé pro aplikaci tedy teplota pod 25 °C, nezvadlé listy, bez vysokého UV záření, tak bude vhodné aplikaci fungicidem provést. Pokud se počasí radikálně nezmění (deště, teplo, vysoká relativní vlhkost), měla by to být aplikace závěrečná, ochranný efekt by měl do začátku září vydržet. Doporučujeme na této aplikaci nešetřit, použít plnou dávku, např. Propulse + měď či azol + měď. Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS

Výsledky monitoringu:

Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	bez DIK

Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
1.08.				?		
2.08.				?		
3.08.				?		
4.08.				?		
5.08.				?		
6.08.						
7.08.						
8.08.						
9.08.						
10.08.						

- Zjednodušené schéma denních infekčních koeficientů (DIK) během července 2026




Bylany 10.8.2026, staré listy usychají a mladší jsou bez příznaků cercosporiózy



Výsledky monitoringu napříč rajónem cukrovarů Tereos TTD

Zvýšený výskyt cercosporiózy je v okolí Prahy a na Nymbursku. V porovnání s předchozími ročníky je ovšem výskyt velmi nízký a tlak infekce slabý. Řada monitorovaných porostů byla už preventivně ošetřena.



DOPORUČENÍ:

Neošetřené i už dříve ošetřené plochy je potřeba v první polovině srpna fungicidy ošetřit, jakmile nastanou podmínky příznivé pro aplikaci. Tzn. teplota pod 25 °C, nezvadlé listy. Pokud se počasí radikálně nezmění (deště, teplo, vysoká relativní vlhkost), mohla by to být aplikace závěrečná, ochranný efekt by měl do začátku září vydržet. Doporučujeme na této aplikaci nešetřit, použít plnou dávku, např. Propulse + měď či azol + měď.

Pokud by se situace zhoršila, rozešleme varovnou SMS. Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepařský institut Semčice