

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 8. zpráva k 19.08.2026

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD.

Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:

Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercosporý	Už ukončeno, spóry houby jsou všudypřítomné

Konečně se dostavila změna počasí a dorazil déšť. Úhrny na jednotlivých lokalitách se liší, ale obecně došlo k mírnému ochlazení a zvýšení vlhkosti v porostech. V tuto chvíli je chrást na řadě míst zdecimovaný suchem a starší listy uschly. Je důležité udržet funkční chrást co nejdéle, aby řepa nezačala naplno retrovegetovat. Jinde se řepa ještě „drží“ a chrást je celkem slušný. Tady ovšem hrozí riziko, že vyšší vzdušná vlhkost se v bohatším chrástu lépe udrží a vytvoří se vhodné mikroklima pro infekci cercosporiózy. Navíc starší listy jsou náchylnější k chorobě. V případě, že ještě fungicidní aplikace neproběhla, tak nyní se dostavuje asi nejkritičtější okamžik a ošetření bude potřeba. Kdo už fungicidně ošetřoval musí zvážit, kdy byla provedena poslední fungicidní ochrana a v případě, že je to déle než 14 dní tak doporučujeme provést fungicidní postřik. Zvláště v případě, že na poslední aplikaci byly použity přípravky pouze na bázi azolů. Vlhčí ráz počasí má pokračovat i v příštích dnech a riziko rozšíření infekce postupně narůstá. Kdo ošetřoval fungicidem minulý týden, tak má řepu ochráněnou a efekt fungicidní ochrany už by měl vydržet do začátku září.

Výsledky monitoringu:

Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	bez DIK

Den	Černuc (Velvary)	Dobruška (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
11.08.						
12.08.						
13.08.						
14.08.						
15.08.						
16.08.						
17.08.						

- Zjednodušené schéma denních infekčních koeficientů (DIK) během července a srpna 2026




Na řadě lokalit starší listy uschly a drží se jen mladší, 17.8.2026 (foto J.Sedláček)



Výsledky monitoringu napříč rajónem cukrovarů Tereos TTD

Cerkosporióza se postupně začíná rozšiřovat na lokalitách, kde už byla zachycená. Z prvním ložisek se šíří na další listy v porostu. Zatím se neobjevily nové příznaky na lokalitách, kde se dosud neobjevila. Letošní průběh je méně obvyklý – slabý tlak a velmi pozvolný nástup díky extrémně suchému počasí. Choroba se objevila zhruba se 4-týdenním zpožděním.



DOPORUČENÍ:

Kdo dosud neošetřil, tak by měl provést fungicidní ochranu právě teď! Porosty ošetřené minulý týden už by měly vydržet ochráněné do začátku září. Tam kde byla poslední aplikace fungicidu před dobou delší než 14 dní, a zvláště při použití azolů, tak je vhodné aplikaci fungicidem ještě provést. U kombinovaných fungicidů (SDHI, strobiluriny, Qil fungicidy) např. Propulse, Queen či Alonty je možné očekávat o něco delší účinek – přibližně 3 týdny.

Sledujte dál náš monitoring!

Klára Pavlů a Jaromír Chochola, Řepařský institut Semčice