

MONITOROVÁNÍ CERKOSPORIÓZY 2026, 9. zpráva k 26.08.2026

Dobrý den, pokračujeme v projektu Monitorování cercosporiózy v rajónu cukrovarů TEREOS TTD.

Opět budeme vycházet z více informačních zdrojů:














Pozorování citlivých odrůd v porostech	22 lokalit, každé pondělí
Pozorování na citlivé krmné řepě	6 lokalit, každé pondělí
Teplota a vlhkost v porostech	6 lokalit, denní hlášení
Sledování letu spór cercosporý	Už ukončeno, spóry houby jsou všudypřítomné

Po extrémně dlouhém období sucha a vysokých teplot dorazil déšť. Ve velmi krátkém období napadlo 50-70 mm srážek. Došlo také k výraznému snížení teplot. V noci klesají teploty k 13- 15 °C a přes den se pohybují střídavě mezi 20- 25 °C. Ačkoliv tedy došlo k nárůstu vlhkosti tak teploty už nejsou pro rozvoj infekce zcela ideální. V minulém týdnu jsme zaznamenali 3 dny s dobrými podmínkami pro šíření choroby, ale nyní už podmínky opět odezněly. Teď je třeba pečlivě zvážit, zda má ještě aplikace fungicidu význam. V první řadě rozhoduje termín poslední aplikace fungicidu. Jestliže došlo k poslední aplikaci po 10.8. a byl použit fungicid s delší dobou ochrany (Queen, Propulse, Alonty) tak už aplikace fungicidu pravděpodobně nebude potřeba. Je třeba také zvážit stav chrástu. Jestliže je suchem hodně zdecimovaný a starší listy již odumřely tak přežívají jen nejmladší listy a ty budou proti infekci odolné. V neposlední řadě je třeba zohlednit i termín sklizně. Pro rané sklizně už ošetření nebude asi efektivní, a navíc hrozí riziko reziduí zvláště se to týká difenoconazolu. U porostů plánovaných pro pozdní sklizeň na konci října a začátku listopadu se může ještě investice do ochrany vyplatit. Ale jen tam, kde už je infekce viditelná a ošetření zde nebylo v srpnu provedeno.


Výsledky monitoringu:

Teplota a relativní vlhkost v porostu – základní podmínky pro rozvoj infekce:

	vysoké nebezpečí šíření cercosporiózy
	vhodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	velmi mírné riziko rozvoje cercosporiózy
	nehodné podmínky pro rozvoj cercosporiózy
	bez DIK


Den	Černuc (Velvary)	Dobrovice (Ml.Boleslav)	Holín (Jičín)	Vyšehořovice (Čelákovice)	Sloveč (Městec Kr.)	Bylany (Chrudim)
17.08.						
18.08.						
19.08.						
20.08.						
21.08.						
22.08.						
23.08.						
24.08.						

- Zjednodušené schéma denních infekčních koeficientů (DIK) během července a srpna 2026



Výsledky monitoringu napříč rajónem cukrovarů Tereos TTD

Cerkosporióza se nadále rozšiřuje velmi pomalu. Zpočátku ji brzdilo extrémní sucho a nyní už budou limitující nižší noční teploty. V porovnání s předchozími ročníky se jedná o extrémně slabý výskyt.



DOPORUČENÍ:

Je třeba zvážit efektivitu a rentabilitu fungicidního ošetření. Tento týden se pravděpodobně jedná o poslední možnost, kdy se ještě může aplikace vyplatit. Je třeba zohlednit stav chrástu, datum posledního ošetření a předpokládaný termín sklizně. Na polích, která se fungicidně ošetřovalo do 10. srpna a cercosporióza se zde vyskytuje, tak doporučujeme ještě ošetřit. Kde se stříkalo po 10.srpnu tak už by ošetření mělo postačovat do konce sezóny. Tam kde se cercosporióza dosud neprojevila, tak už by k masivnímu rozšíření dojít nemělo.

Sledujte dál náš monitoring!